

SU PRUEBA DE PRÁCTICA

ANÁLISIS Y ENFOQUES

NIVEL MEDIO

PARA LAS MATEMÁTICAS DEL PD DEL IB

ANSWERS

Stephen Lee
Michael Cheung
Balance Lee

- 4 Sets de Pruebas de Práctica
- Distribución de los Temas del Examen
- Análisis del Formato de Examen
- Lista Exhaustivas de Fórmulas

Solución de Práctica de Prueba 1 de

AE NM Set 1

Sección A

1. (a) $m + 0,2 = 0,6$ (M1) por enfoque válido
 $m = 0,4$ A1 [2]

(b) $n + 0,4 + 0,2 + 0,1 = 1$ (A1) por sustitución
 $n = 0,3$ A1 [2]

(c) $P(B') = 0,4 + 0,3$ (M1) por enfoque válido
 $P(B') = 0,7$ A1 [2]

2. (a) La media
 $= \frac{300}{15}$ (M1) por enfoque válido
 $= 20$ A1 [2]

(b) (i) -40 A1

(ii) La nueva varianza
 $= (-2)^2(9)$ (M1) por enfoque válido
 $= 36$ A1

(iii) 6 A1 [4]

3. (a) La pendiente de L_1
- $$= \frac{32 - 0}{24 - 8}$$
- $$= 2$$
- La ecuación de L_1 :
- $$y - 0 = 2(x - 8)$$
- $$y = 2x - 16$$
- $$2x - y - 16 = 0$$
- (M1) por enfoque válido
A1
A1
- [3]
- (b) $2 \times -\frac{1}{-a} = -1$
 $2 = -a$
 $a = -2$
- (M1) por enfoque válido
A1
- [2]
4. (a) Lado izquierdo
- $$= (2n+1)^2 + (2n+3)^2 + (2n+5)^2$$
- $$= 4n^2 + 4n + 1 + 4n^2 + 12n + 9 + 4n^2 + 20n + 25$$
- $$= 12n^2 + 36n + 35$$
- $$= 12n^2 + 36n + 33 + 2$$
- $$= 3(4n^2 + 12n + 11) + 2$$
- = Lado derecho
- M1A1
M1
AG
- [3]
- (b) $2n+1$, $2n+3$ y $2n+5$ son tres números impares consecutivos.
- $$(2n+1)^2 + (2n+3)^2 + (2n+5)^2$$
- $$= 3(4n^2 + 12n + 11) + 2$$
- Además $3(4n^2 + 12n + 11)$ es múltiplo de 3.
- Luego, la suma de los cuadrados de tres números impares consecutivos cualesquiera es mayor que un múltiplo de 3 por 2.
- R1
A1
R1
AG
- [3]

5. $f(x) = px^3 + qx^2 - 2x + 1$
- $f'(x) = p(3x^2) + q(2x) - 2(1) + 0$ (A1) por derivadas correctas
- $f'(x) = 3px^2 + 2qx - 2$
- $f'(1) = -1 \div -\frac{1}{15}$
- $\therefore 3p(1)^2 + 2q(1) - 2 = 15$ (M1) por ecuación
- $3p + 2q = 17$
- $2q = 17 - 3p$ A1
- $f^{-1}(41) = 2$
- $\therefore f(2) = 41$ (M1) por enfoque válido
- $p(2)^3 + q(2)^2 - 2(2) + 1 = 41$ A1
- $8p + 4q - 3 = 41$
- $\therefore 8p + 2(17 - 3p) - 3 = 41$ (M1) por sustitución
- $8p + 34 - 6p - 3 = 41$
- $2p = 10$
- $p = 5$ A1
- $\therefore q = \frac{17 - 3(5)}{2}$
- $q = 1$ A1

[8]

6. $kx^2 + (8+k)x - 1 = 0$ no tiene raíces reales.
- $\therefore \Delta < 0$ R1
- $b^2 - 4ac < 0$ (M1) por enfoque válido
- $(8+k)^2 - 4(k)(-1) < 0$ A1
- $64 + 16k + k^2 + 4k < 0$ (A1) por enfoque correcto
- $k^2 + 20k + 64 < 0$ (A1) por inecuación correcta
- $(k+16)(k+4) < 0$ (A1) por factorización
- $\therefore -16 < k < -4$ A2

[8]

Sección B

7. (a) $y = 20 - 4x$ A1 [1]
- (b) $V = (4x)(2x)(20 - 4x)$ (M1) por enfoque válido
 $V = 8x^2(20 - 4x)$
 $V = 160x^2 - 32x^3$ A1 [2]
- (c) $\frac{dV}{dx} = 160(2x) - 32(3x^2)$ (A1) por derivadas correctas
 $\frac{dV}{dx} = 320x - 96x^2$ A1 [2]
- (d) $\frac{dV}{dx} = 0$ (M1) por ecuación
 $\therefore 320x - 96x^2 = 0$ A1
 $32x(10 - 3x) = 0$ (A1) por factorización
 $x = 0$ (Rechazada) o $x = \frac{10}{3}$ A1
 Probando primera derivada, M1A1
- | | | | |
|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| x | $0 < x < \frac{10}{3}$ | $x = \frac{10}{3}$ | $x > \frac{10}{3}$ |
| $\frac{dV}{dx}$ | + | 0 | - |
- Por lo tanto, V alcanza su máximo en $x = \frac{10}{3}$. R1 [7]
- (e) El volumen máximo
 $= 160\left(\frac{10}{3}\right)^2 - 32\left(\frac{10}{3}\right)^3$ (M1) por sustitución
 $= \frac{16000}{9} - \frac{32000}{27}$
 $= \frac{16000}{27} \text{ cm}^3$ A1 [2]
- (f) $\frac{20}{3} \text{ cm}$ A1 [1]

8.	(a)	(i)	$\{y : 0 \leq y \leq 1, y \in \mathbb{R}\}$	A2
		(ii)	$f(x) = 1$ $\therefore \cos^4 x = 1$ $\cos^2 x = -1$ (<i>Rechazada</i>) o $\cos^2 x = 1$ $\cos x = -1$ o $\cos x = 1$ $x = \pi$ o $x = 0, x = 2\pi$ Por lo tanto, hay 3 soluciones.	(M1) por enfoque válido (A1) por valores correctos A1 [5]
	(b)		$f'(x) = (4 \cos^3 x)(-\sin x)$ $f'(x) = -4 \sin x \cos^3 x$	(A1) por regla de la cadena A1 [2]
	(c)		El área de las regiones $= \int_0^\pi (\cos^4 x)(2 \sin x) dx$ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Sea $u = \cos x$ $\frac{du}{dx} = -\sin x \Rightarrow (-1)du = \sin x dx$ $x = \pi \Rightarrow u = \cos \pi = -1$ $x = 0 \Rightarrow u = \cos 0 = 1$</p> </div> $= \int_1^{-1} -2u^4 du$ $= \left[-\frac{2}{5}u^5 \right]_1^{-1}$ $= -\frac{2}{5}(-1)^5 - \left(-\frac{2}{5}(1)^5 \right)$ $= \frac{4}{5}$	(A1) por integral definida (A1) por sustitución M1A1 A1 (M1) por sustitución A1 [7]

9. (a) (i) $a = \frac{37 - (-5)}{2}$ M1A1
 $a = 21$ AG
- (ii) $b = \frac{2\pi}{2(11-2)}$ (M1) por enfoque válido
 $b = \frac{\pi}{9}$ A1
- (iii) $d = \frac{37 + (-5)}{2}$ (M1) por enfoque válido
 $d = 16$ A1
- (iv) $c = -2,5$ A1 [7]
- (b) Las coordenadas de P'
 $= (3(2) + 17, 37 + 8)$ A1
 $= (23, 45)$ A1 [2]
- (c) Translación de $\begin{pmatrix} -12 \\ -20 \end{pmatrix}$ seguida de un estiramiento horizontal del factor de escala $\frac{1}{3}$ A1 [3]

Solución de Práctica de Prueba 2 de

AE NM Set 1

Sección A

1. (a) $y = 3x + 7$
 $\Rightarrow x = 3y + 7$ (A1) por enfoque correcto

$$3y = x - 7$$

$$y = \frac{x - 7}{3}$$

$$\therefore f^{-1}(x) = \frac{x - 7}{3}$$

A1

[2]

(b) $(f \circ g)(x)$
 $= 3g(x) + 7$ (A1) por sustitución
 $= 3(2\sqrt{x}) + 7$
 $= 6\sqrt{x} + 7$

A1


[2]

(c) $(f \circ g)(529)$
 $= 6\sqrt{529} + 7$ (M1) por sustitución
 $= 145$

A1

[2]

2. (a) Por una aproximación correcta de la figura A1
 Por punto mínimo correcto A1
 Por aproximación correcta de los puntos finales A1



[3]

(b) (i) $d = \int_0^5 |v(t)| dt$ (M2) por enfoque válido

$$d = \int_0^5 |2.5t - 5.6\sqrt{t} + 2| dt$$

(ii) $d = 4,084252067 \text{ m}$

$$d = 4,08 \text{ m}$$

[4]

3. (a) El volúmen

$$= \frac{1}{3}\pi r^2 h \quad (\text{M1}) \text{ por enfoque válido}$$

$$= \frac{1}{3}\pi(18)^2(18)$$

$$= 6107,256119 \quad (\text{A1}) \text{ por valor correcto}$$

$$= 6110$$

$$= 6,11 \times 10^3 \text{ cm}^3 \quad \text{A1}$$

[3]

(b) $V = 27 \left(\frac{2}{3}\pi R^3 \right)$ (M1) por ecuación

$$16(6107,256119) = 18\pi R^3 \quad (\text{A1}) \text{ por sustitución}$$

$$R^3 = 1728$$

$$R = 12$$

A1

El radio

$$= 18 : 12$$

$$= 3 : 2$$

A1

[4]

4. (a) $r = \frac{5,4}{4,5}$ (M1) por enfoque válido
 $r = 1,2$ A1 [2]
- (b) $S_{12} = \frac{4,5(1,2^{12} - 1)}{1,2 - 1}$ (A1) por sustitución
 $S_{12} = 178,1122601$
 $S_{12} = 178$ A1 [2]
- (c) $u_n < 678$
 $4,5 \cdot 1,2^{n-1} < 678$
 $4,5 \cdot 1,2^{n-1} - 678 < 0$ (M1) por enfoque válido
 Considerando la gráfica de $y = 4,5 \cdot 1,2^{n-1} - 678$,
 $n < 28,50673$. A1
 Por lo tanto, el mayor valor de n es 28. A1 [3]

5. El término general

$$\begin{aligned}
 &= 2ax \binom{17}{r} (1)^{17-r} (3ax^2)^r && \text{(M1) por desarrollo válido} \\
 &= 2 \binom{17}{r} 3^r a^{r+1} x^{2r+1} \\
 2r+1 &= 9 && \text{(A1) por ecuación correcta} \\
 2r &= 8 \\
 r &= 4 && \text{(A1) por valor correcto} \\
 \text{El término requerido} \\
 &= 2 \binom{17}{4} 3^4 a^{4+1} x^{2(4)+1} \\
 &= 385560a^5 x^9 && \text{(A1) por término correcto} \\
 385560a^5 &= -385560 && \text{(M1) por ecuación} \\
 a^5 &= -1 \\
 a &= -1 && \text{A1}
 \end{aligned}$$

[6]

6. (a) $20P_1 - 17P_0 = 0$

$$\therefore 20(P_0 e^{k(1)}) - 17P_0 = 0$$

A1

$$20e^k - 17 = 0$$

$$e^k = 0,85$$

M1

$$k = \ln 0,85$$

AG

[2]

(b) $\frac{P_t}{P_0} \leq 0,5$

$$\therefore \frac{P_0 e^{(\ln 0,85)t}}{P_0} \leq 0,5$$

(A1) por inecuación correcta

$$e^{(\ln 0,85)t} \leq 0,5$$

(A1) por enfoque correcto

$$(\ln 0,85)t \leq \ln 0,5$$

$$(\ln 0,85)t - \ln 0,5 \leq 0$$

A1

Considerando la gráfica de

$$y = (\ln 0,85)t - \ln 0,5, t \geq 4,2650243.$$

(M1) por enfoque válido

Por lo tanto, el menor número de años enteros
es 43.

A1

[5]

Sección B

7. (a) $a = -0,176$ A1
 $b = 15260$ A1 [2]
- (b) El costo estimado del seguro
 $= -0,176(32500) + 15260$ (A1) por sustitución
 $= 9540\$$ A1 [2]
- (c) El costo del seguro
 $= 9540 \times (1 - 2,5\%)^4$ (M1)(A1) por enfoque válido
 $= 9540 \times 0,975^4$ (A1) por simplificación
 $= 8621,182477\$$
 $= 8620\$$ A1 [4]
- (d) $9540 \times (1 - 2,5\%)^t = 6500$ (M1) por ecuación
 $9540 \times 0,975^t - 6500 = 0$ (A1) por simplificación
Considerando la gráfica de
 $y = 9540 \times 0,975^t - 6500$, $t = 15,154997$. (A1) por valor correcto
Por lo tanto, el año es 2036. A1 [4]

8. (a) La probabilidad requerida
 $= P(T \leq 24)$
 $= 0,9452007106$
 $= 0,945$
- (M1) por enfoque válido
A1 [2]
- (b) $P(U \leq 48) = 0,99494$
 $P\left(Z \leq \frac{48-\mu}{7}\right) = 0,99494$
 $\frac{48-\mu}{7} = 2,571701859$
 $48 - \mu = 18,00191301$
 $\mu = 29,99808699$
 $\mu = 30,0$
- (M1) por estandarización
A1
A1 [3]
- (c) La probabilidad requerida
 $= P(U \leq 36)$
 $= 0,8043925789$
- Por lo tanto, para todos los autobuses que salen a las 8:24 am, 80.439% de ellos llegarán a tiempo a la escuela.
- R1
A1 AG [2]
- (d) La probabilidad requerida
 $= 1 - P(T \leq 12)P(U \leq 48)$
 $- P(12 < T \leq 24)P(U \leq 36)$
 $= 1 - (0,2118553337)(0,99494)$
 $- (0,7333453769)(0,80439)$
 $= 0,1993209666$
 $= 0,199$
- M1A1
(A2) por valores correctos
A1 [5]
- (e) El número esperado
 $= (20)(0,1993209666)$
 $= 3,986419331$
 $= 3,99$
- (A1) por fórmula correcta
A1 [2]

9.	(a)	$AB^2 = r^2 + r^2 - 2(r)(r)\cos 2\alpha$	A1	
		$AB^2 = 2r^2 - 2r^2 \cos 2\alpha$		
		$AB = \sqrt{2r^2 - 2r^2 \cos 2\alpha}$	A1	
		$AB = \sqrt{2r^2(1 - \cos 2\alpha)}$		
		$AB = r\sqrt{2(1 - \cos 2\alpha)}$	AG	[2]
	(b)	La longitud del arco ACB		
		$= (r)(2\alpha)$	A1	
		$= 2r\alpha$		
		$\therefore P$		
		$= 2r\alpha + r\sqrt{2(1 - \cos 2\alpha)}$	M1	
		$= 2r\alpha + r\sqrt{2(1 - (1 - 2\sin^2\alpha))}$	A1	
		$= 2r\alpha + r\sqrt{2(2\sin^2\alpha)}$	A1	
		$= 2r\alpha + r\sqrt{4\sin^2\alpha}$		
		$= 2r\alpha + 2r\sin\alpha$	A1	
		$= 2r(\alpha + \sin\alpha)$	AG	
	(c)			[5]
	(i)	$\theta = 1,1060602$		
		$\theta = 1,11$	A1	
	(ii)	$\theta = 0,7897927$		
		$\theta = 0,790$	A1	
	(d)	$1,5(2r) < P < 2(2r)$	M1A1	[2]
		$\therefore 1,5(2r) < 2r(\alpha + \sin\alpha) < 2(2r)$		
		$1,5 < \alpha + \sin\alpha < 2$	(A1) for inecuación correcta	
		$1,5 < f(\alpha) < 2$		
		Usando (c), $0,7897927 < \alpha < 1,1060602$.	(M1) por enfoque válido	
		$\therefore 0,790 < \alpha < 1,11$	A1	
				[5]

Solución de Práctica de Prueba 1 de

AE NM Set 2

Sección A

1. (a) $12 + f + 10 + 16 + 24 = 80$ (M1) por ecuación
 $f = 18$ A1 [2]
- (b) (i) La mediana
 $= \frac{3+4}{2}$ (M1) por enfoque válido
 $= 3,5$ A1
- (ii) 5 A1
- (iii) El rango intercuartil
 $= \frac{5+5}{2} - \frac{2+2}{2}$ (M1) por enfoque válido
 $= 3$ A1 [5]
2. (a) (i) 7 A1
- (ii) 1 A1 [2]
- (b) $(f \circ g)(x)$
 $= (g(x))^2$ (A1) por sustitución
 $= (3-4x)^2$
 $= 9-24x+16x^2$ A1 [2]
- (c) $y = 3-4x$
 $\Rightarrow x = 3-4y$ (A1) por enfoque correcto
 $4y = 3-x$
 $y = \frac{3-x}{4}$
 $\therefore g^{-1}(x) = \frac{3-x}{4}$ A1 [2]

3. (a) $g'(x) = 4 \cos 2x$
- $$g(x) = \int 4 \cos 2x dx$$
- Sea $u = 2x$
 $\frac{du}{dx} = 2 \Rightarrow du = 2dx$
- $$g(x) = \int 2 \cos u du$$
- $$g(x) = 2 \sin u + C$$
- $$g(x) = 2 \sin 2x + C$$
- $$\therefore 7 = 2 \sin 2\left(\frac{\pi}{4}\right) + C$$
- $$7 = 2 \sin \frac{\pi}{2} + C$$
- $$7 = 2 + C$$
- $$C = 5$$
- $$\therefore g(x) = 2 \sin 2x + 5$$

(M1) por integral indefinida

(A1) por sustitución

A1

(M1) por sustitución

[5]

(b) 5

A1

[1]

4. (a) Lado derecho
- $$= \frac{1 \times 49}{1 \times 49} + \frac{2 \times 7}{7 \times 7} + \frac{5}{49}$$
- $$= \frac{49 + 14 + 5}{49}$$
- $$= \frac{68}{49}$$
- = Lado izquierdo
- $$\therefore \frac{68}{49} = 1 + \frac{2}{7} + \frac{5}{49}$$
- AG [2]
- (b) Lado derecho
- $$= \frac{1 \times (m+2)^2}{1 \times (m+2)^2} + \frac{2 \times (m+2)}{(m+2) \times (m+2)} + \frac{5}{(m+2)^2}$$
- $$= \frac{(m^2 + 4m + 4) + (2m + 4) + 5}{(m+2)^2}$$
- $$= \frac{m^2 + 6m + 9 + 4}{(m+2)^2}$$
- $$= \frac{(m+3)^2 + 4}{(m+2)^2}$$
- = Lado izquierdo
- $$\therefore \frac{(m+3)^2 + 4}{(m+2)^2} \equiv 1 + \frac{2}{m+2} + \frac{5}{(m+2)^2} \text{ para } m \neq -2$$
- AG [3]
5. $9 \log_{27}(x+1) = 1 + \log_3(3+x+x^2)$
- $$\frac{9 \log_3(x+1)}{\log_3 27} = \log_3 3 + \log_3(3+x+x^2)$$
- (M1)(A1) por cambio de base
- $$\frac{9 \log_3(x+1)}{3} = \log_3 3(3+x+x^2)$$
- (A1) por enfoque correcto
- $$3 \log_3(x+1) = \log_3 3(3+x+x^2)$$
- $$\log_3(x+1)^3 = \log_3 3(3+x+x^2)$$
- A1
- $$\therefore (x+1)^3 = 3(3+x+x^2)$$
- M1
- $$x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = 9 + 3x + 3x^2$$
- $$x^3 = 8$$
- A1
- $$x = \sqrt[3]{8}$$
- A1
- A1 [7]

6. (a) El discriminante de $f(x)$
- $$= b^2 - 4ac$$
- $$= (8-p)^2 - 4 \left(1 + 2p - \frac{3}{8} p^2 \right) (-2) \quad \text{M1A1}$$
- $$= 64 - 16p + p^2 + 8 + 16p - 3p^2 \quad \text{A1}$$
- $$= 72 - 2p^2 \quad \text{AG}$$
- [3]
- (b) $f(x) = 0$ tiene dos raíces iguales
- $$\therefore 72 - 2p^2 = 0 \quad (\text{M1}) \text{ por ecuación}$$
- $$2p^2 = 72$$
- $$p^2 = 36$$
- $$p = -6 \text{ o } p = 6 \quad \text{A2}$$
- [3]
- (c) $p = 6$
- $$\therefore \left(1 + 2(6) - \frac{3}{8}(6)^2 \right) x^2 + (8-6)x - 2 = 0 \quad (\text{M1}) \text{ por ecuación}$$
- $$-\frac{1}{2}x^2 + 2x - 2 = 0$$
- $$x^2 - 4x + 4 = 0$$
- $$(x-2)^2 = 0$$
- $$x = 2 \quad \text{A1}$$
- [2]

Sección B

7. (a) $f'(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 5x$
- $$f(x) = \int \left(-\frac{1}{2}x^2 + 5x \right) dx$$
- $$f(x) = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}x^3 \right) + 5 \left(\frac{1}{2}x^2 \right) + C$$
- $$f(x) = -\frac{1}{6}x^3 + \frac{5}{2}x^2 + C$$
- $$\therefore -\frac{26}{3} = -\frac{1}{6}(0)^3 + \frac{5}{2}(0)^2 + C$$
- $$C = -\frac{26}{3}$$
- $$\therefore f(x) = -\frac{1}{6}x^3 + \frac{5}{2}x^2 - \frac{26}{3}$$
- $$f(2) = -\frac{1}{6}(2)^3 + \frac{5}{2}(2)^2 - \frac{26}{3}$$
- $$f(2) = -\frac{4}{3} + 10 - \frac{26}{3}$$
- $$f(2) = 0$$
- (M1) por integral indefinida
A1
(M1) por sustitución
A1
(M1) por sustitución
A1
[6]
- (b) $f''(x) = -\frac{1}{2}(2x) + 5(1)$
- $$f''(x) = -x + 5$$
- $$f''(x) = 0$$
- $$\therefore -x + 5 = 0$$
- $$x = 5$$
- $$f(5) = -\frac{1}{6}(5)^3 + \frac{5}{2}(5)^2 - \frac{26}{3}$$
- $$f(5) = -\frac{125}{6} + \frac{375}{6} - \frac{52}{6}$$
- $$f(5) = 33$$
- Por lo tanto, las coordenadas de P son (5, 33). A1
(A1) por derivadas correctas
(M1) por ecuación
A1
(M1) por sustitución
[5]
- (c) La gráfica de f es cóncava hacia arriba
- $$\therefore f''(x) > 0$$
- $$-x + 5 > 0$$
- $$x < 5$$
- (A1) por inecuación correcta
A1
[2]

8.	(a)	$2r + h = 20$	(A1) por enfoque correcto
		$2r = 20 - h$	
		$r = 10 - \frac{1}{2}h$	A1
			[2]
	(b)	$V = \pi r^2 h$	
		$V = \pi \left(10 - \frac{1}{2}h\right)^2 h$	(A1) por sustitución
		$V = 100\pi h - 10\pi h^2 + \frac{1}{4}\pi h^3$	A1
			[2]
	(c)	$Q = (3)(2\pi rh) + (4)(\pi r^2)$	M1A1
		$Q = 6\pi \left(10 - \frac{1}{2}h\right)h + 4\pi \left(10 - \frac{1}{2}h\right)^2$	M1
		$Q = 60\pi h - 3\pi h^2 + 400\pi - 40\pi h + \pi h^2$	A1
		$Q = 400\pi + 20\pi h - 2\pi h^2$	
		$Q = 2\pi(200 + 10h - h^2)$	AG
			[4]
	(d)	$\frac{dQ}{dh} = 2\pi(0 + 10(1) - 2h)$	(A1) por derivadas correctas
		$\frac{dQ}{dh} = 4\pi(5 - h)$	A1
		$\frac{dQ}{dh} = 0$	(M1) por ecuación
		$\therefore 4\pi(5 - h) = 0$	A1
		$h = 5$	A1
		El valor máximo de Q	
		$= 2\pi(200 + 10(5) - (5)^2)$	(M1) por sustitución
		$= 450\pi$	A1
			[7]

9. (a) $r = \frac{20 \cos^4 \alpha}{30 \cos^2 \alpha}$ (M1) por enfoque válido

$$r = \frac{2}{3} \cos^2 \alpha \quad \text{A1}$$

[2]

(b) $\pi \leq \alpha \leq \frac{4}{3}\pi$
 $\therefore \cos \pi \leq \cos \alpha \leq \cos \frac{4}{3}\pi$ (M1) por enfoque válido

$$-1 \leq \cos \alpha \leq -\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{4} \leq \cos^2 \alpha \leq 1$$

$$\frac{1}{6} \leq \frac{2}{3} \cos^2 \alpha \leq \frac{2}{3}$$

$$\therefore \frac{1}{6} \leq r \leq \frac{2}{3} \quad \text{A1}$$

[2]

(c) $S_\infty = \frac{30 \cos^2 \alpha}{1 - \frac{2}{3} \cos^2 \alpha} \quad \text{A1}$

$$S_\infty = \frac{30 \cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha - \frac{2}{3} \cos^2 \alpha} \quad \text{M1}$$

$$S_\infty = \frac{30 \cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha + \frac{1}{3} \cos^2 \alpha} \quad \text{A1}$$

$$S_\infty = \frac{30}{\tan^2 \alpha + \frac{1}{3}} \quad \text{A1}$$

$$S_\infty = \frac{90}{3 \tan^2 \alpha + 1} \quad \text{AG}$$

[4]

(d) $\pi \leq \alpha \leq \frac{4}{3}\pi$

$$\therefore \tan \pi \leq \tan \alpha \leq \tan \frac{4}{3}\pi$$

M1

$$0 \leq \tan \alpha \leq \sqrt{3}$$

$$0 \leq \tan^2 \alpha \leq 3$$

A1

$$0 \leq 3 \tan^2 \alpha \leq 9$$

$$1 \leq 3 \tan^2 \alpha + 1 \leq 10$$

$$\therefore \frac{1}{10} \leq \frac{1}{3 \tan^2 \alpha + 1} \leq 1$$

A1

$$9 \leq S_{\infty} \leq 90$$

A1

Cuando $\alpha = \frac{4}{3}\pi$,

$$S_{\infty} = \frac{90}{3 \tan^2 \left(\frac{4}{3}\pi \right) + 1}$$

M1

$$S_{\infty} = 9$$

Por lo tanto, S_{∞} alcanza su mínimo en

$$\alpha = \frac{4}{3}\pi.$$

AG

[5]

Solución de Práctica de Prueba 2 de

AE NM Set 2

Sección A

- | | | | |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 1. | (a) $(3, 5)$ | A2 | |
| | | | [2] |
| | (b) $g(x) = -(x - 3)^2 + 5$ | A2 | |
| | | | [2] |
| | (c) $(-3, 5)$ | A2 | |
| | | | [2] |
| 2. | (a) $d = 6 - 4, 9$ | (M1) por enfoque válido | |
| | $d = 1, 1$ | A1 | |
| | | | [2] |
| | (b) $u_1 = 4, 9 - 1, 1$ | (M1) por enfoque válido | |
| | $u_1 = 3, 8$ | A1 | |
| | | | [2] |
| | (c) $S_{38} = \frac{38}{2} [2(3, 8) + (38 - 1)(1, 1)]$ | (A1) por sustitución | |
| | $S_{38} = 917, 7$ | A1 | |
| | | | [2] |

- 3.
- $$\left(kx - \frac{4}{x}\right)^8 = (kx)^8 + \binom{8}{1}(kx)^7\left(-\frac{4}{x}\right) + \binom{8}{2}(kx)^6\left(-\frac{4}{x}\right)^2 + \binom{8}{3}(kx)^5\left(-\frac{4}{x}\right)^3 + \binom{8}{4}(kx)^4\left(-\frac{4}{x}\right)^4 + \dots$$
- $$\left(kx - \frac{4}{x}\right)^8 = k^8 x^8 + 8k^7 x^7 \left(-\frac{4}{x}\right) + 28k^6 x^6 \left(\frac{16}{x^2}\right) + 56k^5 x^5 \left(-\frac{64}{x^3}\right) + 70k^4 x^4 \left(\frac{256}{x^4}\right) + \dots$$
- $$\left(kx - \frac{4}{x}\right)^8 = k^8 x^8 - 32k^7 x^6 + 448k^6 x^4 - 3584k^5 x^2 + 17920k^4 + \dots$$
- $$\therefore 448k^6 : 17920k^4 = 9 : 40$$
- $$\frac{448k^6}{17920k^4} = \frac{9}{40}$$
- $$\frac{k^2}{40} = \frac{9}{40}$$
- $$k = -3 \text{ o } k = 3 \quad (\text{Rechazado})$$
- A1
- (M1)(A1) por enfoque correcto
(A1) por simplificación
- A1
- A1
- A1
- [6]
4. (a) $A = 2\pi r^2 + 2\pi rh + 2\pi r^2$
 $135\pi = 4\pi r^2 + 2\pi r(3,5)$
 $135 = 4r^2 + 7r$
 $4r^2 + 7r - 135 = 0$
 $(4r + 27)(r - 5) = 0$
 $4r + 27 = 0 \text{ o } r - 5 = 0$
 $r = -\frac{27}{4} \quad (\text{Rechazado}) \text{ o } r = 5 \text{ mm}$
- (M2) por ecuación
(A1) por sustitución
- (M1) por ecuación cuadrática
- A1
- [5]
- (b) El volumen
 $= \frac{4}{3}\pi r^3 + \pi r^2 h$
 $= \frac{4}{3}\pi(5)^3 + \pi(5)^2(3,5)$
 $= 798,4881328 \text{ mm}^3$
 $= 798 \text{ mm}^3$
- (M1) por enfoque válido
- A1
- [2]

5. $X \sim B\left(5, \frac{2p}{p+2p+10}\right)$ (R1) por distribución correcta
- La desviación típica de X
- $$= \sqrt{5\left(\frac{2p}{3p+10}\right)\left(1-\frac{2p}{3p+10}\right)}$$
- $$= \sqrt{5\left(\frac{2p}{3p+10}\right)\left(\frac{p+10}{3p+10}\right)}$$
- $$\therefore \sqrt{5\left(\frac{2p}{3p+10}\right)\left(\frac{p+10}{3p+10}\right)} > \frac{11}{10}$$
- $$5\left(\frac{2p}{3p+10}\right)\left(\frac{p+10}{3p+10}\right) > \frac{121}{100}$$
- $$5\left(\frac{2p}{3p+10}\right)\left(\frac{p+10}{3p+10}\right) - \frac{121}{100} > 0$$
- Considerando la gráfica de
- $$y = 5\left(\frac{2p}{3p+10}\right)\left(\frac{p+10}{3p+10}\right) - \frac{121}{100},$$
- $$5,3435147 < p < 25,443002.$$
- Por lo tanto, el mayor valor de p es 25. A1
- [6]

6. $v = \int (8 - 8t)dt$ (M1) por integral indefinida
- $$v = 8t - 8\left(\frac{1}{2}t^2\right) + C$$
- $$v = 8t - 4t^2 + C$$
- La velocidad inicial
- $$= 8(0) - 4(0)^2 + C$$
- $$= C$$
- La diferencia entre velocidades es 4 ms^{-1}
- $$\therefore 8t - 4t^2 + C = C + 4 \text{ o } \therefore 8t - 4t^2 + C = C - 4$$
- $$4t^2 - 8t + 4 = 0 \text{ o } 4t^2 - 8t - 4 = 0$$
- $$4(t-1)^2 = 0 \text{ o } t = \frac{-(-8) \pm \sqrt{(-8)-4(4)(-4)}}{2(4)}$$
- $$t = 1 \text{ o } t = 2,414213562,$$
- $$t = -0,4142135624 \text{ (Rechazado)}$$
- $$\therefore m = 1 \text{ o } m = 2,41$$
- A1
- (M1) por enfoque válido
- (A1) por enfoque correcto
A2
- A2
- [8]

Section B

7.	(a)	$a = 5,6$	A1	
		$b = 34,8$	A1	[2]
	(b)	La dureza estimada $= 5,6(6,3) + 34,8$ $= 70,08$	(A1) por sustitución A1	
	(c)	(i) La probabilidad requerida $= \frac{108}{120}$ $= \frac{9}{10}$	(M1) por enfoque válido A1	[2]
		(ii) La probabilidad requerida $= \frac{120 - 56}{120}$ $= \frac{8}{15}$	(M1) por enfoque válido A1	
		(iii) La probabilidad requerida $= \frac{120 - 108}{120 - 56}$ $= \frac{3}{16}$	(M1) por enfoque válido A1	
	(d)	$\left(\frac{120-q}{120}\right)\left(\frac{120-q-1}{120-1}\right) = \frac{29}{476}$ $\left(\frac{120-q}{120}\right)\left(\frac{119-q}{119}\right) = \frac{29}{476}$ $(120-q)(119-q) = 870$ $(120-q)(119-q) - 870 = 0$ Considerando la gráfica de $y = (120-q)(119-q) - 870$, $q = 90$ o $q = 149$ (<i>Rechazado</i>). $\therefore q = 90$	(A1) por ecuación correcta A1	[6]
				[2]

8. (a) (i) $\cos A\hat{C}B = \frac{r^2 + (1,5r)^2 - (1,75r)^2}{2(r)(1,5r)}$ M1A1

$$\cos A\hat{C}B = \frac{0,1875r^2}{3r^2}$$
 A1

$$\cos A\hat{C}B = 0,0625$$
 AG

(ii) $\sin A\hat{C}B = \sqrt{1 - \cos^2 A\hat{C}B}$

$$\sin A\hat{C}B = \sqrt{1 - 0,0625^2}$$
 (A1) por sustitución

$$\sin A\hat{C}B = 0,9980449639$$

$$\sin A\hat{C}B = 0,998$$
 A1

[5]

(b) $\frac{1}{2}(r)(1,5r)\sin A\hat{C}B = 7$ (M1) por ecuación

$$(0,75r^2)(0,9980449639) = 7$$

$$r^2 = 9,35161608$$

$$r = 3,058041216$$

$$r = 3,06$$
 A1

[2]

(c) (i) $\frac{\sin A\hat{B}C}{AC} = \frac{\sin A\hat{C}B}{AB}$ (M1) por regla del seno

$$\frac{\sin A\hat{B}C}{1,5r} = \frac{0,9980449639}{1,75r}$$
 (A1) por sustitución

$$\sin A\hat{B}C = 0,8554671119$$

$$A\hat{B}C = 1,026452178 \text{ rad}$$

$$A\hat{B}C = 1,03 \text{ rad}$$
 A1

(ii) El área del sector BDC

$$= \frac{1}{2}(3,058041216)^2(\pi - 1,026452178)$$
 (A1) por sustitución

$$= 9,88999084$$

$$= 9,89$$
 A1

[5]

9.	(a)	$P(L > 59,2) = 0,12$	(M1) por enfoque válido
		$P\left(Z > \frac{59,2 - \mu}{3,5}\right) = 0,12$	(A1) por enfoque correcto
		$\frac{59,2 - \mu}{3,5} = 1,174986791$	A1
		$59,2 - \mu = 4,11245377$	
		$\mu = 55,08754623$	
(b)		$\mu = 55,1$	A1
			[4]
		$P(L < q) = 0,55$	
		$P\left(Z < \frac{q - 55,08754623}{3,5}\right) = 0,55$	(A1) por enfoque correcto
		$\frac{q - 55,08754623}{3,5} = 0,1256613375$	
(c)		$q - 55,08754623 = 0,4398146813$	
	(i)	$q = 55,52736091$	A1
		$\therefore q = 55,5$	A1
			[3]
			(R1) por distribución correcta
(ii)		$E(X) = (10)(0,55)$	(A1) por sustitución
		$E(X) = 5,5$	A1
		$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5)$	(M1) por enfoque válido
		$P(X > 5) = 1 - 0,4955954083$	A1
(d)		$P(X > 5) = 0,5044045917$	
		$P(X > 5) = 0,504$	A1
			[6]
		$m\left(\frac{55\%}{55\% + 33\%}\right)(0,8) + m\left(\frac{33\%}{55\% + 33\%}\right)(1,1)$	(M1)(A1) por enfoque correcto
		$= (949)(1000)$	
		$0,5m + 0,4125m = 949000$	A1
		$0,9125m = 949000$	
		$m = 1040000$	A1
			[4]

Solución de Práctica de Prueba 1 de

AE NM Set 3

Sección A

1. (a) La ecuación del eje de simetría:

$$x = -\frac{-20}{2(2)} \quad (\text{A1}) \text{ por sustitución}$$

$$x = 5 \quad \text{A1}$$

[2]

(b) (i) 2 A1

(ii) 5 A1

(iii) $k = 2(5)^2 - 20(5) + 60 \quad (\text{M1})(\text{A1}) \text{ por sustitución}$

$$k = 10 \quad \text{A1}$$

[5]

2. (a) La diferencia común

$$= 95 - 100 \quad (\text{M1}) \text{ por enfoque válido}$$

$$= -5 \quad \text{A1}$$

[2]

- (b) El décimo quinto término

$$= 100 + (15-1)(-5) \quad (\text{A1}) \text{ por sustitución}$$

$$= 30 \quad \text{A1}$$

[2]

- (c) La suma de los primeros 15 términos

$$= \frac{15}{2} [2(100) + (15-1)(-5)] \quad (\text{A1}) \text{ por sustitución}$$

$$= 975 \quad \text{A1}$$

[2]

3. (a) El gradiente de L_1 es 2. A1
 El intercepto de L_1 con el eje y es -20. A1 [2]
- (b) El gradiente de L_2 es $-\frac{1}{2}$. (A1) por valor correcto
 La ecuación de L_2 :

$$y - (-20) = -\frac{1}{2}(x - 0)$$
 A1

$$y + 20 = -\frac{1}{2}x$$

$$2y + 40 = -x$$

$$x + 2y + 40 = 0$$
 A1 [3]
4. (a) (i) 4 A1
 (ii) $\frac{1}{3}$ A1
 (iii) -1 A1 [3]
- (b) $\log_{27} x + \frac{8}{3} = \log_4 256 + \log_{125} 5 + \log_{\pi} \frac{1}{\pi}$

$$\log_{27} x + \frac{8}{3} = 4 + \frac{1}{3} - 1$$
 (M1) por sustitución

$$\log_{27} x = \frac{2}{3}$$

$$x = 27^{\frac{2}{3}}$$
 (A1) por enfoque correcto

$$x = (3^3)^{\frac{2}{3}}$$

$$x = 3^2$$

$$x = 9$$
 A1 [3]

5.
$$\begin{aligned} & \left(1 - \frac{3}{4}x\right)^n (1 + 2nx)^3 \\ &= \left(1 + \binom{n}{1}\left(-\frac{3}{4}x\right) + \dots\right) \left(1 + \binom{3}{1}(2nx) + \dots\right) && (\text{M1}) \text{ por expansión válida} \\ &= \left(1 + (n)\left(-\frac{3}{4}x\right) + \dots\right) (1 + (3)(2nx) + \dots) && (\text{A1}) \text{ por enfoque válido} \\ &= \left(1 - \frac{3}{4}nx + \dots\right) (1 + 6nx + \dots) && \text{A2} \end{aligned}$$

El coeficiente de x

$$\begin{aligned} &= (1)(6n) + \left(-\frac{3}{4}n\right)(1) && (\text{A1}) \text{ por enfoque correcto} \\ &= \frac{21}{4}n \\ \therefore \frac{21}{4}n &= \frac{105}{4} && (\text{M1}) \text{ por ecuación} \\ n &= 5 && \text{A1} \end{aligned}$$

[7]

6.
$$\begin{aligned} & -3\sqrt{3} \leq f(x) \leq 3\sqrt{3} \\ & -3\sqrt{3} \leq 6 \sin 2x \leq 3\sqrt{3} \\ & -\frac{\sqrt{3}}{2} \leq \sin 2x \leq \frac{\sqrt{3}}{2} && \text{A1} \\ \therefore \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) &\leq \sin 2x \leq \sin\left(\frac{\pi}{3}\right), \\ \sin\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) &\leq \sin 2x \leq \sin\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) && (\text{A2}) \text{ por rangos correctos} \\ \sin\left(2\pi - \frac{\pi}{3}\right) &\leq \sin 2x \leq \sin\left(2\pi + \frac{\pi}{3}\right) \\ -\frac{\pi}{3} \leq 2x &\leq \frac{\pi}{3}, \quad \frac{2\pi}{3} \leq 2x \leq \frac{4\pi}{3} \text{ o } \frac{5\pi}{3} \leq 2x \leq \frac{7\pi}{3} && \text{A1} \\ -\frac{\pi}{6} \leq x &\leq \frac{\pi}{6}, \quad \frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3} \text{ o } \frac{5\pi}{6} \leq x \leq \frac{7\pi}{6} && (\text{M1}) \text{ por enfoque válido} \\ \therefore 0 \leq x &\leq \frac{\pi}{6}, \quad \frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3} \text{ o } \frac{5\pi}{6} \leq x \leq \frac{7\pi}{6} && \text{A3} \end{aligned}$$

[8]

Sección B

7. (a) (i) El número de niñas
 $= 35 + 45 - 50$
 $= 30$

(M1) por enfoque válido

A1

(ii) 5 A1

[3]

(b) (i) $\frac{9}{10}$ A1

(ii) La probabilidad requerida
 $= \frac{30}{50} \div \frac{9}{10}$

(A1) por sustitución

A1

[3]

(c) La probabilidad requerida
 $= \left(\frac{5}{50} \right) \left(\frac{4}{49} \right)$

(M1) por enfoque válido

$= \frac{2}{245}$ A1

[2]

(d) (i) $P(G \cap V) = \frac{30}{50}$ A1

$\therefore P(G \cap V) \neq 0$ R1

Por lo tanto, G y V no son mutuamente excluyentes. AG

(ii) $P(G) = \frac{35}{50}$ A1

$P(V) = \frac{45}{50}$

$P(G) \cdot P(V) = \frac{63}{100}$ A1

$\therefore P(G) \cdot P(V) \neq P(G \cap V)$ R1

Por lo tanto, G y V no son independientes. AG

[5]

8.	(a)	$f''(x) = k(2x) - 12(1) - 0$	(A1) por derivadas correctas
		$f''(x) = 2kx - 12$	A1
			[2]
	(b)	$f''(1,5) = 0$	M1
		$\therefore 2k(1,5) - 12 = 0$	A1
		$3k = 12$	A1
		$k = 4$	AG
			[3]
	(c)	$f'(4) = 4(4)^2 - 12(4) - 40$	(M1) por sustitución
		$f'(4) = -24$	A1
		La pendiente de la normal	
		$= \frac{-1}{-24}$	(A1) por enfoque correcto
		$= \frac{1}{24}$	
		La ecuación de la normal:	
		$y - \frac{13}{6} = \frac{1}{24}(x - 4)$	M1A1
		$y - \frac{13}{6} = \frac{1}{24}x - \frac{1}{6}$	
		$y = \frac{1}{24}x + 2$	A1
			[6]
	(d)	$f''(5) = 2(4)(5) - 12$	M1
		$f''(5) = 28$	A1
		$f''(5) > 0$	R1
		Luego, la gráfica de f tiene un mínimo local	
		en $x = 5$.	AG
			[3]

9. (a) $g(x) - f(x) = 0$
- $$e^{\frac{1}{2}\sqrt{x}} - e^{\frac{1}{2}\sqrt{x}} \sin\left(\frac{\pi}{3}x\right) = 0$$
- $$e^{\frac{1}{2}\sqrt{x}} \left(1 - \sin\left(\frac{\pi}{3}x\right)\right) = 0$$
- $$1 - \sin\left(\frac{\pi}{3}x\right) = 0$$
- $$\sin\left(\frac{\pi}{3}x\right) = 1$$
- A1
- $$\frac{\pi}{3}x = \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}x = \frac{5\pi}{2} \text{ o } \frac{\pi}{3}x = \frac{9\pi}{2}$$
- (A1) por valores correctos
- $$x = \frac{3}{2}, x = \frac{15}{2} \text{ o } x = \frac{27}{2}$$
- A3
- [6]
- (b) (i) $\frac{\pi}{3}x_n = \frac{\pi}{2} + (n-1)(2\pi)$
- $$x_n = \frac{3}{2} + 6(n-1)$$
- $$x_{n+1} - x_n$$
- $$= \left(\frac{3}{2} + 6((n+1)-1)\right) - \left(\frac{3}{2} + 6(n-1)\right)$$
- $$x_{n+1} - x_n = \left(\frac{3}{2} + 6n\right) - \left(\frac{3}{2} + 6n - 6\right)$$
- $$x_{n+1} - x_n = 6$$
- A1
- Las diferencias entre cada par de términos consecutivos son iguales a 6.
Por lo tanto, x_1, x_2, x_3, \dots es una progresión aritmética.
- AG
- (ii) $x_n = \frac{3}{2} + 6n - 6$
- $$x_n = 6n - \frac{9}{2}$$
- A1
- [4]

(c) Nótese que $x_2 = \frac{15}{2}$ y $x_3 = \frac{27}{2}$.

$$f(x) = 0$$

$$e^{\frac{1}{2}\sqrt{x}} \sin\left(\frac{\pi}{3}x\right) = 0$$

M1

$$\sin\left(\frac{\pi}{3}x\right) = 0$$

$$\frac{\pi}{3}x = 3\pi \quad \text{o} \quad \frac{\pi}{3}x = 4\pi$$

$$x = 9 \quad \text{o} \quad x = 12$$

(A1) por valores correctos

$$\therefore R = \int_{\frac{15}{2}}^9 \left(e^{\frac{1}{2}\sqrt{x}} - e^{\frac{1}{2}\sqrt{x}} \sin\left(\frac{\pi}{3}x\right) \right) dx + \int_9^{12} e^{\frac{1}{2}\sqrt{x}} dx$$

A2

$$+ \int_{12}^{\frac{27}{2}} \left(e^{\frac{1}{2}\sqrt{x}} - e^{\frac{1}{2}\sqrt{x}} \sin\left(\frac{\pi}{3}x\right) \right) dx$$

[4]

Solución de Práctica de Prueba 2 de

AE NM Set 3

Sección A

1. (a) $x = 3$ A2 [2]
- (b) La intersección con el eje y
 $= \frac{4}{3-0} + \frac{2}{3}e^0$ (M1) por enfoque válido
 $= \frac{4}{3} + \frac{2}{3}$
 $= 2$ A1 [2]
- (c) $f'(2) = 8,9260422$ A1
 $f'(2) = 8,93$ A1 [2]
2. (a) (i) 6 A1
- (ii) 6 A1
- (iii) El rango
 $= 18 - 3$ (M1) por enfoque válido
 $= 15$ A1 [4]
- (b) (i) La media
 $(3)(12) + (6)(20) + (9)(12)$
 $= \frac{+(12)(8) + (15)(4) + (18)(4)}{12 + 20 + 12 + 8 + 4 + 4}$ (M1) por enfoque válido
 $= 8,2$ A1
- (ii) La varianza
 $= 4,308131846^2$ (M1) por enfoque válido
 $= 18,6$ A1 [4]

3. La razón común

$$\begin{aligned} &= \frac{9600}{12000} \\ &= 0,8 \end{aligned}$$

$$u_n > 96$$

$$\therefore 12000 \times 0,8^{n-1} > 96$$

$$12000 \times 0,8^{n-1} - 96 > 0$$

Considerando la gráfica de $y = 12000 \times 0,8^{n-1} - 96$,

$$n < 22,637702.$$

Por lo tanto, el mayor valor de n es 22.

(M1) por enfoque válido

A1

(M1) por inecuación

A1

4. (a) $f(x) = g(x)$

$$\begin{aligned} \pi e^{-x^2} &= 1 + \frac{1}{\pi e^{-x^2}} \\ \pi e^{-x^2} - 1 - \frac{e^{x^2}}{\pi} &= 0 \end{aligned}$$

Considerando la gráfica de $y = \pi e^{-x^2} - 1 - \frac{e^{x^2}}{\pi}$,

$$x = -0,814566 \text{ o } x = 0,8145662.$$

$$\therefore a = -0,815, b = 0,815$$

(M1) por ecuación

A2

[3]

(b) El área requerido

$$\begin{aligned} &= \int_{-0,814566}^{0,8145662} (f(x) - g(x)) dx \\ &= \int_{-0,814566}^{0,8145662} \left(\pi e^{-x^2} - 1 - \frac{e^{x^2}}{\pi} \right) dx \\ &= 1,890606422 \\ &= 1,89 \end{aligned}$$

(A1) por integral correcta

(A1) por valor correcto

A1

[3]

5.	(a)	(i)	$\frac{1}{2}$	A1
		(ii)	3	A1
		(iii)	-4	A1
				[3]
	(b)	Las coordenadas de P'		
		$= \left(\frac{2}{2} + 3, -5(8 - 4) \right)$	(A2) por enfoque correcto	
		$= (4, -20)$	A2	
				[4]
6.	Sea H la altura (en cm) de un árbol.			
	$P(H < 400) = 0,2119$			
	$P\left(Z < \frac{400 - \mu}{25}\right) = 0,2119$	(M1) por estandarización		
	$\frac{400 - \mu}{25} = -0,7998460519$	A1		
	$400 - \mu = -19,9961513$			
	$\mu = 419,9961513$	A1		
	$P(H > 394) = 0,8507942645$	(A1) por valor correcto		
	$\therefore P(H > 394 + r) = 0,8507942645 - 0,5$	A1		
	$P(H > 394 + r) = 0,3507942645$			
	$394 + r = 429,5755765$	(A1) por valor correcto		
	$r = 35,5755765$			
	$r = 35,6$	A1		
				[7]

Sección B

7. (a) $a = -0,0807147258$

$a = -0,0807$

A1

$b = 3,177202711$

$b = 3,18$

A1

[2]

(b) $\log y = -0,0807147258\sqrt{9} + 3,177202711$

(M1) por enfoque válido

$\log y = 2,935058534$

$y = 10^{2,935058534}$

(M1) por enfoque válido

$y = 861,1098035$

$y = 861$

A1

[3]

(c) $\log y = -0,0807147258\sqrt{x} + 3,177202711$

(M1) por enfoque válido

$y = 10^{-0,0807147258\sqrt{x}+3,177202711}$

(A1) por enfoque correcto

$y = 10^{-0,0807147258\sqrt{x}} \cdot 10^{3,177202711}$

A1

$y = 10^{3,177202711} \cdot (10^{-0,0807147258})^{\sqrt{x}}$

A1

$k = 10^{3,177202711}$

(A1) por enfoque correcto

$k = 1503,843735$

$k = 1500$

A1

$m = 10^{-0,0807147258}$

(A1) por enfoque correcto

$m = 0,8303960491$

$m = 0,830$

A1

[7]

8. (a) (i) Considerando la gráfica de
 $y = \sin\left(\frac{\pi}{6}x\right) - \cos\left(\frac{\pi}{6}x\right)$, las
 coordenadas del punto máximo y
 mínimo son $(4,5000008; 1,4142136)$ y
 $(10,500001; -1,414214)$ respectivamente. (A2) por enfoque correcto
 Por lo tanto, la función es creciente
 cuando $0 \leq x < 4,50$ o $10,5 < x \leq 12$. A2
- (ii) $4,50 < x < 10,5$ A1 [5]
- (b) (i) $a = \frac{1,4142136 - (-1,414214)}{2}$ (M1) por enfoque válido
 $a = 1,4142138$
 $a = 1,41$ A1
- (ii) Note que $f(0) = -1$.
 $-1 = 1,4142138 \sin\left(\frac{\pi}{6}(0+h)\right)$ (M1) por ecuación
 $-0,7071066624 = \sin\left(\frac{\pi}{6}h\right)$ (A1) por enfoque correcto
 $\frac{\pi}{6}h = 5,497787312$ o $-0,7853979954$ (A1) por enfoque correcto
 $h = 10,50000032$ (*Rechazado*) o
 $h = -1,499999679$ A1
 $\therefore h = -1,50$ A1 [7]

9. (a) $\cos \theta = \frac{AB}{r}$

$AB = r \cos \theta$

A1

[1]

(b) $\sin \theta = \frac{AE}{r}$

$AE = r \sin \theta$

A1

El área del triangulo ABE

$$= \frac{(AB)(AE)}{2}$$

$$= \frac{(r \cos \theta)(r \sin \theta)}{2}$$

M1

$$= \frac{1}{2} r^2 \sin \theta \cos \theta$$

A1

$$= \frac{1}{2} r^2 \left(\frac{1}{2} \sin 2\theta \right)$$

A1

$$= \frac{r^2 \sin 2\theta}{4}$$

AG

[4]

(c) $A\hat{E}B + B\hat{E}C + C\hat{E}D = \pi$

M1

$$\left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) + B\hat{E}C + \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \pi$$

A1

$$\pi - 2\theta + B\hat{E}C = \pi$$

$$B\hat{E}C = 2\theta$$

AG

[2]

- (d) ABCD es un cuadrado
 $\therefore AB = 2AE$ (M1) por enfoque válido
 $r \cos \theta = 2r \sin \theta$
 $\cos \theta - 2 \sin \theta = 0$ (A1) por ecuación correcta
 Considerando la gráfica de $y = \cos \theta - 2 \sin \theta$,
 $\theta = 0,4636476$. A1
 El área del sector EBC
 $= \frac{1}{2} r^2 (2(0,4636476))$ (A1) por sustitución
 $= 0,4636476r^2$
 $\therefore 0,4636476r^2 = k \left(\frac{r^2 \sin 2(0,4636476)}{4} \right)$ M1A1
 $k = 0,4636476 \left(\frac{4}{\sin 2(0,4636476)} \right)$
 $k = 2,318238031$
 $k = 2,32$ A1 [7]
- (e) $r^2 \theta = 3 \left(\frac{r^2 \sin 2\theta}{4} \right)$ (A1) por ecuación correcta
 $\theta - \frac{3}{4} \sin 2\theta = 0$
 Considerando la gráfica de $y = \theta - \frac{3}{4} \sin 2\theta$,
 $\theta = 0,7478908$ rad.
 $\therefore \theta = 0,748$ rad A1 [2]

Solución de Práctica de Prueba 1 de

AE NM Set 4

Sección A

1. (a) El área de la región sombreada

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2}(20)^2(1,5) \\ &= 300 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

(A1) por sustitución

A1

[2]

- (b) La longitud de arco ABC

$$\begin{aligned} &= (20)(1,5) \\ &= 30 \text{ cm} \end{aligned}$$

(A1) por sustitución

A1

[2]

- (c) El perímetro requerido

$$\begin{aligned} &= 2\pi(20) - 30 + 20 + 20 \\ &= (40\pi + 10) \text{ cm} \end{aligned}$$

(M1) por enfoque válido

A1

[2]

2. (a) $\log_4 64$

$$\begin{aligned} &= \log_4 4^3 \\ &= 3 \end{aligned}$$

(A1) por enfoque correcto

A1

[2]

- (b) $\log_{12} 36 + \log_{12} 4$

$$\begin{aligned} &= \log_{12} 144 \\ &= \log_{12} 12^2 \\ &= 2 \end{aligned}$$

(A1) por enfoque correcto

A1

[2]

- (c) $\log_2 11 - \log_2 88$


$$\begin{aligned} &= \log_2 \frac{1}{8} \\ &= \log_2 2^{-3} \\ &= -3 \end{aligned}$$

(A1) por enfoque correcto

A1

[2]

3. (a) $f'(x) = 3e^{3x+1}$ A1
 $f''(x) = 9e^{3x+1}$ A1
 $f^{(3)}(x) = 27e^{3x+1}$ A1 [3]
- (b) $f^{(n)}(x) = 3^n e^{3x+1}$ A3 [3]
- (c) $f^{(6)}\left(-\frac{1}{3}\right) = 729$ A1 [1]
4. (a) Por correcta ubicación de la intersección con ambos ejes A1
Por correcta ubicación de los puntos $(-4, 1)$ y $(1, 2)$ A1 [2]



- (b) $p = 2$ A2
 $q = -1$ A2 [4]

5. (a) $u_9 = 6 \ln 2$
 $\therefore \ln 0,25 + (9-1)(\ln D) = 6 \ln 2$
 $\ln 0,25 + 8 \ln D = \ln 64$
 $8 \ln D = \ln 64 - \ln 0,25$
 $8 \ln D = \ln 256$
 $8 \ln D = \ln 2^8$
 $8 \ln D = 8 \ln 2$
 $\therefore D = 2$
- (A1) por ecuación correcta
(A1) por enfoque correcto
(A1) por enfoque correcto
(M1) por enfoque válido
- A1 [5]
- (b) La suma de los primeros siete términos
 $= \frac{7}{2} [2 \ln 0,25 + (7-1)(\ln 2)]$
 $= 7 \ln 2^{-2} + 21 \ln 2$
 $= -14 \ln 2 + 21 \ln 2$
 $= 7 \ln 2$
- (A1) por sustitución
A1
A1 [3]
6. (a) $a = 2(-\operatorname{sen} \pi t)(\pi) + 0$
 $a = -2\pi \operatorname{sen} \pi t$
- (A1) por derivadas correctas
A1 [2]
- (b) $s = \int (2 \cos \pi t + \pi) dt$
 $s = \int 2 \cos \pi t dt + \int \pi dt$

Sea $u = \pi t$
 $\frac{du}{dt} = \pi \Rightarrow \frac{1}{\pi} du = dt$

 $s = \int \frac{2}{\pi} \cos u du + \int \pi dt$
 $s = \frac{2}{\pi} \operatorname{sen} u + \pi t + C$
 $s = \frac{2}{\pi} \operatorname{sen} \pi t + \pi t + C$
 $\therefore -3 = \frac{2}{\pi} \operatorname{sen} 0 + 0 + C$
 $C = -3$
 $\therefore s = \frac{2}{\pi} \operatorname{sen} \pi t + \pi t - 3$
- (M1) por integral indefinida
(A1) por sustitución
A1 [5]

Sección B

7. (a) $x - 4 = 7$ (M1) por enfoque válido
 $x = 11$ A1 [2]
- (b) El número de personas
 $= \frac{20 + 40}{4}$ (M1) por enfoque válido
 $= 15$ A1 [2]
- (c) La media de horas
 $= \frac{120}{20}$ (M1) por sustitución
 $= 6$ A1 [2]
- (d) (i) El total de horas
 $= (60)(9)$ (M1) por enfoque válido
 $= 540$ A1
- (ii) La media de horas
 $= \frac{540 - 120}{40}$ (M1)(A1) por enfoque correcto
 $= 10,5$ A1 [5]
- (e) (i) La media requerida
 $= 10,5 + 1,5$ (M1) por enfoque válido
 $= 12$ A1
- (ii) La varianza requerida
 $= 2^2$ (M1)(A1) por enfoque correcto
 $= 4$ A1 [5]

8. (a) (i) La probabilidad requerida
 $= \frac{3}{n}$ A1
- (ii) La probabilidad requerida
 $= \left(\frac{n-3}{n} \right) \left(\frac{n-4}{n-1} \right) \left(\frac{3}{n-2} \right)$ (A1) por enfoque correcto
 $= \frac{3(n-3)(n-4)}{n(n-1)(n-2)}$ A1 [3]
- (b) La probabilidad requerida
 $= \left(\frac{7}{10} \right) \left(\frac{6}{9} \right) \left(\frac{5}{8} \right) \left(\frac{3}{7} \right)$ (A1) por enfoque correcto
 $= \frac{1}{8}$ A1 [2]
- (c) El juego es justo si la ganancia esperada es cero, lo que equivale a que la cantidad de dinero recibida de vuelta sea 10\$. R1
 $\therefore \left(\frac{3}{10} \right)(10) + \left(\left(\frac{7}{10} \right) \left(\frac{3}{9} \right) \right)(10)$
 $+ \left(\left(\frac{7}{10} \right) \left(\frac{6}{9} \right) \left(\frac{3}{8} \right) \right)(25x) + \left(\frac{1}{8} \right)(21x)$ M1A2
 $+ \left(1 - \frac{3}{10} - \left(\frac{7}{10} \right) \left(\frac{3}{9} \right) - \left(\frac{7}{10} \right) \left(\frac{6}{9} \right) \left(\frac{3}{8} \right) - \frac{1}{8} \right)(0) = 10$
 $3 + \frac{7}{3} + \frac{35}{8}x + \frac{21}{8}x = 10$ M1A1
 $7x = \frac{14}{3}$ A1
 $x = \frac{2}{3}$ AG [7]

9.	(a)	$f'(x) = \left(\frac{1}{x^2+4}\right)(2x+0)$	(A2) por derivadas correctas
		$f'(2) = \frac{2(2)}{2^2+4}$	(M1) por sustitución
		$f'(2) = \frac{1}{2}$	A1
			[4]
	(b) (i)	2	A1
	(ii)	1	A1
			[2]
	(c)	$h(x) = (f \circ g)(x)$	
		$h(x) = f(g(x))$	
		$h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$	(A1) por regla de la cadena
		La pendiente de la tangente	
		$= h'(5)$	
		$= f'(g(5)) \cdot g'(5)$	
		$= f'(2) \cdot g'(5)$	(M1) por enfoque válido
		$= \left(\frac{1}{2}\right)(1)$	
		$= \frac{1}{2}$	A1
		$h(5) = f(g(5))$	
		$h(5) = f(2)$	(M1) por enfoque válido
		$h(5) = \ln(2^2 + 4)$	
		$h(5) = \ln 8$	
		La ecuación de la tangente:	
		$y - \ln 8 = \frac{1}{2}(x - 5)$	A1
		$y - \ln 8 = \frac{1}{2}x - \frac{5}{2}$	
		$y = \frac{1}{2}x + \left(\ln 8 - \frac{5}{2}\right)$	A1
			[6]

Solución de Práctica de Prueba 2 de

AE NM Set 4

Sección A

1. (a) (i) $r = 0,956518027$ A1
 $r = 0,957$ A1
- (ii) $a = 2,022727273$
 $a = 2,02$ A1
 $b = -75,9469697$
 $b = -75,9$ A1 [4]
- (b) La puntuación final aproximada
 $= 2,022727273(84) - 75,9469697$ (A1) por sustitución
 $= 93,96212123$
 $= 94,0$ A1 [2]
2. (a) (i) $(3, -127)$ A2
- (ii) $f(x) = 3(x - 3)^2 - 127$ A2 [4]
- (b) $3x^2 - 18x - 100 = -52$
 $3x^2 - 18x - 48 = 0$ (A1) por ecuación correcta
 $3(x + 2)(x - 8) = 0$
 $x = -2 \text{ o } x = 8$ A2 [3]

3. (a) $P(W > m) = 0,087$
 $m = 4,343908413$
 $m = 4,34$
- (A1) por valor correcto
A1
- [2]
- (b) $P(W > 4,5 | W > 4,343908413)$
 $= \frac{P(W > 4,5 \cap W > 4,343908413)}{P(W > 4,343908413)}$
 $= \frac{P(W > 4,5)}{P(W > 4,343908413)}$
 $= \frac{0,0630016205}{0,087}$
 $= 0,7241565576$
 $= 0,724$
- (A1) por enfoque correcto
M1
A1
A1
- [4]
4. (a) $(g \circ f)(x)$
 $= 2(f(x))^2 - 5$
 $= 2(e^x)^2 - 5$
 $= 2e^{2x} - 5$
- (A1) por sustitución
A1
- [2]
- (b) (i) $(g \circ f)(x) = x^3$
 $2e^{2x} - 5 = x^3$
 $2e^{2x} - 5 - x^3 = 0$
Considerando la gráfica de
 $y = 2e^{2x} - 5 - x^3$, $x = -1,702369$ o
 $x = 0,4683121$ (*Rechazado*)
 $\therefore x = -1,70$
- (A1) por ecuación correcta
A1
- (ii) $f(\sqrt[3]{p}) = g^{-1}(p)$
 $(g \circ f)(\sqrt[3]{p}) = (p)$
 $\therefore \sqrt[3]{p} = -1,702369$
 $p = -4,933567865$
 $p = -4,93$
- (M1) por enfoque válido
(A1) por enfoque correcto
A1
- [5]

5. (a) La razón común r
- $$= \frac{3k^2 - 4k^3}{k^2}$$
- $$= 3 - 4k$$
- (M1) por enfoque válido
- A1
- [2]
- (b) S_∞ existe si $-1 < r < 1$.
- $$\therefore -1 < 3 - 4k < 1$$
- $$-1 < 4k - 3 < 1$$
- $$2 < 4k < 4$$
- $$\frac{1}{2} < k < 1$$
- R1
- M1
- A1
- AG
- [3]
- (c) $800rS_\infty + 243 = 0$
- $$\therefore 800(3 - 4k) \left(\frac{k^2}{1 - (3 - 4k)} \right) + 243 = 0$$
- (M1) por ecuación
- $$800(3 - 4k)k^2 + 243(4k - 2) = 0$$
- Considerando la gráfica de
- $$y = 800(3 - 4k)k^2 + 243(4k - 2),$$
- $$k = -0,492582 \text{ (Rechazado)},$$
- $$k = 0,3425823 \text{ (Rechazado)} \text{ o } k = 0,9.$$
- $$\therefore k = 0,9$$
- A2
- [3]

6. El término general

$$= \binom{9}{r} \left(\frac{x}{h^2} \right)^{9-r} \left(-\frac{h}{x^2} \right)^r$$

$$= \binom{9}{r} (-1)^r h^{3r-18} x^{9-3r}$$

$$9-3r = 0$$

(M1) por expansión válida

$$3r = 9$$

$$r = 3$$

(A1) por ecuación correcta

El término requerido

$$= \binom{9}{3} (-1)^3 h^{3(3)-18} x^{9-3(3)}$$

$$= -\frac{84}{h^9}$$

(A1) por valor correcto

$$-\frac{84}{h^9} = -\frac{21}{65536}$$

(M1) por ecuación

$$h^9 = 262144$$

$$h = 4$$

A1

[6]

Sección B

7. (a) La altura de la marea alta
 $= 1,9 + 4,3$
 $= 6,2 \text{ m}$

(M1) por enfoque válido

A1

[2]

(b) p es negativo ya que el primer punto de retorno es un punto mínimo.

R1

$$p = -\frac{4,3}{2}$$

A1

$$p = -2,15$$

AG

[2]

(c) (i) El periodo
 $= 13,75 - 2,75$
 $= 11 \text{ horas}$
 $\therefore q = \frac{2\pi}{11}$

(M1) por enfoque válido

(A1) por valor correcto

A1

(ii) $r = \frac{6,2 + 1,9}{2}$
 $r = 4,05$

(M1) por enfoque válido

A1

[5]

(d) 4 de enero del 2021 implica $24 \leq t < 48$.

(M1) por enfoque válido

$$t = 13,75 + 3(11)$$

$$t = 46,75$$

(A1) por valor correcto

Por lo tanto, la hora es 22:45.

A1

[3]

8. (a) \hat{BAC}
 $= \pi - 0,88 - 1,23$ (M1) por enfoque válido
 $= 1,031592654$ A1

$$\frac{AB}{\sin A\hat{C}B} = \frac{BC}{\sin B\hat{A}C} \quad (\text{M1}) \text{ por regla del seno}$$

$$\frac{AB}{\sin 1,23} = \frac{20}{\sin 1,031592654} \quad (\text{A1}) \text{ por sustitución}$$

$$AB = 21,96641928 \text{ cm}$$

$$AB = 22,0 \text{ cm} \quad \text{A1}$$

[5]

(b) (i) $AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2(OA)(OB)\cos A\hat{O}B \quad \text{M1}$

$$AB^2 = r^2 + r^2 - 2(r)(r)\cos A\hat{O}B \quad \text{A1}$$

$$AB^2 = 2r^2 - 2r^2 \cos A\hat{O}B$$

$$AB^2 = 2r^2(1 - \cos A\hat{O}B) \quad \text{A1}$$

$$r^2 = \frac{AB^2}{2(1 - \cos A\hat{O}B)} \quad \text{AG}$$

(ii) $A\hat{O}B = 2A\hat{C}B$

$$A\hat{O}B = 2,46 \text{ rad} \quad (\text{A1}) \text{ por valor correcto}$$

$$\therefore r^2 = \frac{21,96641928^2}{2(1 - \cos 2,46)} \quad (\text{A1}) \text{ por sustitución}$$

$$r = 11,65341128$$

$$r = 11,7 \quad \text{A1}$$

[6]

(c) La suma requerida

$$= \pi(11,65341128)^2 - \frac{1}{2}(21,96641928)(20)\sin 0,88 \quad \text{M1A1}$$

$$= 257,3308144 \text{ cm}^2$$

$$= 257 \text{ cm}^2 \quad \text{A1}$$

[3]

9.	(a)	(i)	$a_1(t) = \frac{20-30}{2-0}$	M1A1
			$a_1(t) = -5$	AG
		(ii)	$v_1(t) = -5t + 30$	A2
				[4]
	(b)	La distancia total recorrida		
		$= \int_0^2 v_1(t) dt$		(M1) por enfoque válido
		$= \int_0^2 -5t + 30 dt$		(A1) por fórmula correcta
		$= 50 \text{ cm}$		A1
				[3]
	(c)	(i)	$v_2(2) = 20$	
			$\therefore 20e^{b-0,2(2)} = 20$	M1
			$e^{b-0,4} = 1$	
			$b - 0,4 = 0$	A1
			$b = 0,4$	AG
		(ii)	$\int_2^c v_2(t) dt = 50$	
			$\int_2^c 20e^{0,4-0,2t} dt = 50$	(M1) por ecuación
		Sea $u = 0,4 - 0,2t$ $\frac{du}{dt} = -0,2 \Rightarrow -100du = 20dt$ $t = c \Rightarrow u = 0,4 - 0,2c$ $t = 2 \Rightarrow u = 0,4 - 0,2(2) = 0$		
			$\int_0^{0,4-0,2c} -100e^u du = 50$	(A1) por sustitución
			$\left[-100e^u \right]_0^{0,4-0,2c} = 50$	A1
			$e^{0,4-0,2c} - e^0 = -0,5$	
			$e^{0,4-0,2c} = 0,5$	(M1) por sustitución
			$0,4 - 0,2c = \ln 0,5$	
			$0,4 - \ln 0,5 = 0,2c$	
			$c = 5,465735903$	
			$c = 5,47$	A1
				[7]